

Pilzwiderstandsfähige Weißweinsorten

Johanniter (FR 177-68)



Kreuzung: Riesling x (Seyve-Villard 12-481 x (Ruländer x Gutedel))

<p><u>Austrieb:</u> einige Tage vor Riesling</p> <p><u>Blütezeitpkt.:</u> mit Riesling</p> <p><u>Traubenentwkl./Traubenschluss:</u> kurz vor Riesling</p> <p><u>Färben/Weichwerden:</u> eine Woche vor Riesling</p> <p><u>Erntereife:</u> zwischen Weißburgunder und Riesling</p>	<p><u>Pero.-Festigkeit:</u> hoch, bei sehr hohem Infektionsdruck z.T. Blattbefall möglich, ggf. 1 Behandlung</p> <p><u>Oidium-Festigkeit:</u> hoch, ggf. 1 Behandlung</p> <p><u>Verrieselung:</u> sehr gering</p> <p><u>Stiellähme:</u> sehr gering</p> <p><u>Traubengröße:</u> mittel groß, kompakt, länger als bei Riesling</p> <p><u>Beerengröße/-dichte:</u> mittel groß / relativ hoch</p>
<p>Ernteergebnisse (Mittelwerte aus 55 Ernten, jeweils gleich alte Reben, gleicher Standort, gleiches Jahr)</p>	
<p>Johanniter 133 ka/a 85.1 °Oe 9.2 a/l Mostsr.</p>	
<p>Rieslina 120 ka/a 78.4 °Oe 11.5 a/l Mostsr.</p>	
<p><u>Weintyp:</u> kräftig, fruchtig, neutral bis Riesling-ähnlich bukettiert, reife Säure</p>	